



УТВЕРЖДЕНО
генеральный директор
институт КРЫМАГРОТЕХНОЛОГИЙ
Чабоненко В.А.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ «ПРОБИОЛАКТ» ДЛЯ КРС

Кормовая добавка Пробиолакт используется как пробиотик, иммуномодулятор, антитоксин для:

- стимуляции роста молодняка сельскохозяйственных животных и птицы до 15%;
- профилактики и лечения желудочно-кишечных заболеваний телят, поросят, птицы, обусловленных *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Salmonella typhi murium*, *Shigella dysenteriae*, *Shigella sonnei* и другими патогенами;
- поддержания и восстановления положительной микрофлоры в желудочно-кишечном тракте (в том числе во время и после применения антибиотиков);
- стимуляции и поддержания продуктивности;
- формирования высокой скорости иммунного ответа (в том числе при вакцинации);
- повышения перевариваемости питательных веществ корма;
- профилактики стрессов (технологических, кормовых, температурных);
- увеличения сохранности молодняка и ремонтного поголовья.
- при расстройствах желудочно-кишечного тракта различного характера;
- при снижении гуморального и клеточного иммунитета;
- выведения из организма эндо- и экзотоксинов (обладает способностью выводить консерванты, красители);
- при аллергических состояниях различного происхождения (пищевых, бытовых, кожных);
- при терапии гормональными препаратами, отравлениях, токсикозах различного характера, в том числе при эндотоксикозах;
- при заболеваниях кожи различного происхождения;
- при проведении плановых вакцинаций и дегельминтизации;
- молодым животным в период роста для повышения адаптационных возможностей организма;
- старым животным при нарушении синтеза и всасывания витаминов, аминокислот, питательных веществ.

Рекомендации по применению для КРС разных возрастных групп.

ПРИМЕНЕНИЕ ДОЙНЫМ КОРОВАМ.

Способ применения

Первые 15 дней 50-100 мл на тонну воды.

Далее постоянно поддерживающую дозу 25-50мл на тонну воды ежедневно утром 1 раз в день.

ПРИМЕНЕНИЕ БЫКАМ - ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ

Способ применения

Первые 15 дней 50-100 мл на тонну воды.

Далее постоянно поддерживающую дозу 25-50мл на тонну воды ежедневно утром 1 раз в день.

ПРИМЕНЕНИЕ СТЕЛЬНОМ КОРОВАМ

Способ применения

за 2-3 недели до отела 200мл на тонну воды.

ПРИМЕНЕНИЕ НОВОРОЖДЕННЫМ ТЕЛЯТАМ

Способ применения

При назначении Пробиолакта стельной корове заселение нормальной микрофлорой ЖКТ теленка начинается уже при прохождении им родовых путей, с кожи вымени, из окружающей среды.

С первого дня жизни выпаивают в виде водной суспензии, а также смешивая с молозивом или молоком индивидуально в дозе 1 мл в день на теленка (рекомендуется разделить на 2 приема). Повышает эффективность ЗЦМ и сквашивает молоко при температуре не ниже 38°C в течение 1 часа.

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕЛЯТАМ 1-6-МЕСЯЧНОГО ВОЗРАСТА

Способ применения

1-3 месяца – 1 мл на теленка, путем внесения в ЗЦМ или воду.

3-6 месяцев – 2 мл на теленка.

СОГЛАСОВАНО:

Директор по развитию и научному
сопровождению продукции
ООО Институт Крымагротехнологий



Черняев Н.Н.